

Basic Life Support en automatische externe defibrillatie (AED) aangepast voor COVID-19

Voor professionele zorgverleners

Geen reactie en ademt niet normaal

Evalueer de ademhaling visueel:
open de luchtweg niet of
benader de neus en de mond van het slachtoffer niet

Alarmeer het ALS team

ga de COVID-19 toestand na

Bedek de neus en de mond van het slachtoffer
met een chirurgisch masker of een doek

Leg de AED aan zodra deze beschikbaar is,
zelfs als men enkel een PBM tegen
druppelverspreiding draagt

Trek de PBM tegen luchtgedragen partikels aan (als dat niet
reeds is gebeurd);
overweeg een optimale teamgrootte

Geef 30 borstcompressies

**Geef 2 beademingen
door middel van ventilatie met ballon en masker
(100% zuurstof)**

Niet via mond-op-mond of mond-op-masker

Ga verder met CPR 30:2

Wissel elke 2 minuten van hulpverlener

Ventilatie met ballon en masker: gebruik een 2-persoonstechniek (één persoon zorgt voor maskerafdichting, de andere persoon zorgt voor borstcompressies en geeft ook de ventilaties); plaats een virusfilter tussen zak en masker.

BLS teams die minder getraind zijn of het niet gewoon zijn met ballon en masker te beademen, moeten een zuurstofmasker op het gezicht van het slachtoffer plaatsen, zuurstof geven en alleen met continue borstcompressies reanimeren